



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 14-11-01009554

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 22 du 4 juillet 2001 - 2 pages - Numéro ordre postal : 48

### Pois

STADES : fin du remplissage des gousses à jaunissement plus ou moins avancé.

### Maladies

Très peu de symptômes de maladies sont visibles.

### Tordeuses

Malgré les conditions chaudes et bien ensoleillées durant la floraison des pois, les captures de tordeuses n'auront été guère plus élevées que lors des campagnes précédentes. Seuls 2 pièges sur 33 auront dépassés le seuil des 400 captures cumulées nécessaires sur pois protéagineux (voir carte).

### Féverole

STADES : remplissage des gousses

### Maladies

Absence de pluies, sénescence des feuilles, les maladies n'évoluent guère, mis à part la rouille, présente dans la plupart des parcelles. Exemples de fréquence de plantes avec des pustules :

\* témoins non traités :

Crécy la Chapelle	20%
Maisoncelles en Brie	100%
Doue	100%
Choisy en Brie	30%
Chaumes en Brie	20%

\* parcelles traitées :

Jouy le Châtel	10 et 40%
Chambry	50%
Blandy les tours	50%

Dans la majorité des situations, le nombre de pustules / feuilles reste encore limité. A surveiller.

### Maïs

STADES : 8 à 12 feuilles

### Ravageurs

Peu d'évolution des pucerons. Lorsqu'ils sont présents, le nombre moyen reste infé-

rieur à 20 pucerons / plante.

Le vol de pyrale est désormais pratiquement généralisé à l'ensemble de la région (voir carte). Seuls les pièges de Limours (91), Ablis (78), Le Mesnil Aubry (95), Doue et Crouy / Ourcq (77) n'ont enregistré aucune capture. Là où le vol a démarré le plus tôt, les captures sont en forte progression, et les premières pontes peuvent s'observer (ex Crisenoy et Citry / Marne-77).

Comment déterminer le risque localement ?

\* si vous avez réalisé des sondages larvaires à l'automne :

- au delà de 1 larve / pied, risque élevé,
- en dessous de 0,5 larve / pied, risque faible

\* par l'observation des pontes de pyrale quand le vol a débuté (plaque d'oeufs blanchâtres ou jaunâtres à la face inférieure des feuilles) :

Risque élevé au delà de 10 pontes pour 100 plantes.

**Dates d'intervention :**

\* secteurs où le vol a débuté vers le 18-21 juin, intervention à partir de la fin de cette semaine,

\* secteurs où le vol a débuté entre le 25/6 et le 2/7, intervention à partir du 10-12 juillet.

**Attention aux pullulations éventuelles de pucerons suite aux applications anti-pyrale.**

### Betteraves

STADES : 60-100% de couverture du sol

### Ravageurs

Les pucerons restent encore présents. Maintenir la protection insecticide sur les parcelles n'ayant pas atteint la couverture du sol.

### Maïs

Dates de traitement pyrale.

Service Régional de la  
Protection des  
Végétaux  
ILE DE FRANCE  
10 rue du séminaire  
94516 RUNGIS cedex  
Tél : 01-41-73-48-00  
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station  
D'Alertes  
Agricoles de Rungis  
Directeur gérant :  
J. BOULUD

Publication périodique  
C.P.A.P.  
n°0904 B 00536  
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 370 F  
Fax 435 F



60 Jo- 68744 JS

722

Carte de répartition des communes de tortues de l'Île-de-France en 2007. Les communes et les nombres inscrits sont :

- Mantec: 220
- Houdan: 242
- Pontoise: 25
- Meaux: 198
- Rebais: 42
- Jouy: 198
- Melun: 395
- Bray s/ Seir: 490
- Nemours: 12
- Ferté-Alais: 175
- Etampes: 316
- Rambouillet: 49
- Dordan: 102
- Melun: 300
- Nemours: 347
- Nemours: 175
- Nemours: 236
- Nemours: 12
- Nemours: 347
- Nemours: 175
- Nemours: 236
- Nemours: 12

Carte de répartition des captures de pyrales en Seine-et-Marne, 02/07. La carte est divisée en zones géographiques avec des captures indiquées par un nombre et une date entre parenthèses.

Zone	Captures (date)
Pontoise	0
Mantes	14 (18/6)
Houdan	26 (18/6)
Rambouillet	0
Ugny	0
Etampes	17 (2/7)
Ferté-Alais	2 (25/6)
Melun	1 (2/7)
Nemours	8 (18/6)
Meaux	8 (2/7)
Rebais	0
Jouy	1 (2/7)
Bray s/ Seine	1 (2/7)
Proche de Nemours	6 (2/7)
Proche de Meaux	4 (2/7)
Proche de Melun	17 (18/6)
Proche de Etampes	1 (2/7)
Proche de Ferté-Alais	1 (2/7)
Proche de Nemours	0 (21/6)
Proche de Meaux	3 (25/6)
Proche de Rebais	0
Proche de Jouy	13 (2/7)

Réseau SRPV - CAIF

## Colza

## Blé

Dans les zones à problèmes de ray-grass, pensez à utiliser des variétés tolérantes au chlortoluron.